

СОГЛАСОВАНО:

Председатель профкома:

 Каюмова Г.М.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор:



Порядок проведения уборки (дезинфекции) помещений МБОУ «СОШ №43»

График проветривания и влажной уборки на время учебного процесса:

Проветривание кабинетов после каждого урока – преподаватели (ответственные за кабинеты).

- 07.30 - влажная уборка туалетных помещений, используя дезинфицирующих средств.
- с 08.00-08.30 – влажная уборка коридора 1 этажа;
- с 08.45 до 10.00 - влажная уборка рекреаций, коридоров 1,2,3,4 этажа и лестничных клеток;
- на участках с 1 по 3 классы (начальный блок) – обработка поверхностей дез. средствами во время перемен и со стороны коридора во время уроков (ручки дверей, подоконники, стекла и т.д.)
- с 10.00 – 10.45 - участки 4-х - 7ых классов
- с 13.45 -14.00 - участки 7-х - 9-х классов
- с 10.45 до 12.15 - влажная уборка рекреаций, коридоров и лестничных клеток;
- с 12.15 до 13.00 – технический перерыв.
- с 14.30 до 16.30 – **общая уборка помещений.**
- После каждой перемены произвести влажную уборку туалетных помещений.
- МОП поддерживать чистоту, порядок на закрепленной территории, проводить генеральную уборку (1раз в месяц)
- Содержать в чистоте стены, окна, полы, отопительные приборы и т.д.

Образовательная организация (коридоры, классы, рекреации)				
	Вне эпидемической ситуации	Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация		
1	Ежедневная влажная уборка с моющими средствами после каждой перемены.	Ежедневная влажная уборка с дезинфицирующими средствами после каждой перемены.		
2	Генеральная уборка техническим персоналом 1р. в месяц во всех видах помещений общеобразовательного учреждения -(график)	Ежедневное обеззараживание всех помещения, где находились дети из класса (группы) с установленным карантином, дезинфекция - по режиму соответствующей инфекции (бактерии, вирусы).		
3	Уборочный инвентарь для уборки помещений должен быть промаркирован и закреплен за определенными помещениями.	<table border="1"> <tr> <td><u>При капельных инфекциях (ОРВИ, Грипп, вирусные пневмонии) –</u> -проветривание классов (на каждой перемене), -тщательное удаление пыли в помещениях, -обеззараживание посуды;</td> <td><u>При кишечных инфекциях</u> -обеззараживание посуды, -игрушек, -поверхностей обеденных столов, -туалетов.</td> </tr> </table>	<u>При капельных инфекциях (ОРВИ, Грипп, вирусные пневмонии) –</u> -проветривание классов (на каждой перемене), -тщательное удаление пыли в помещениях, -обеззараживание посуды;	<u>При кишечных инфекциях</u> -обеззараживание посуды, -игрушек, -поверхностей обеденных столов, -туалетов.
<u>При капельных инфекциях (ОРВИ, Грипп, вирусные пневмонии) –</u> -проветривание классов (на каждой перемене), -тщательное удаление пыли в помещениях, -обеззараживание посуды;	<u>При кишечных инфекциях</u> -обеззараживание посуды, -игрушек, -поверхностей обеденных столов, -туалетов.			
4.	По окончании уборки инвентарь промывают, ополаскивают и просушивают. Хранят уборочный инвентарь в отведенном для этих целей месте.	По окончании уборки в конце смены весь уборочный инвентарь должен промываться с использованием моющих и дезинфицирующих средств, просушиваться .Хранят уборочный инвентарь в отведенном для этих целей месте.		

1. **Уборку учебных и вспомогательных помещений** проводят **после окончания уроков** (по окончании каждой смены), в отсутствие обучающихся, при открытых окнах или фрамугах: моют полы, протирают места скопления пыли (подоконники, радиаторы и др.)
2. Для проведения **уборки и дезинфекции** в общеобразовательном учреждении используют **моющие и дезинфицирующие средства**, разрешенные к применению в **детских учреждениях**, соблюдая инструкции по их применению.
- 3-**Дезинфицирующие растворы для мытья полов** готовят **перед непосредственным применением в туалетных комнатах** в отсутствие обучающихся. Дезинфицирующие и моющие средства **хранят в упаковке производителя**, в местах, **недоступных для обучающихся.**
- 4-**Генеральная уборка техническим персоналом** проводится с применением разрешенных моющих и дезинфицирующих средств.
-Вытяжные вентиляционные решетки ежемесячно очищают от пыли.
5. В медицинском кабинете, помимо обеззараживания помещения и предметов обстановки, необходимо дезинфицировать медицинские инструменты в соответствии с указаниями по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения.

Порядок проведения уборки (дезинфекции) помещений пищеблока, туалетных комнат
МБОУ «СОШ №43»

Пищеблок	Туалетные комнаты (независимо от эпидемиологической ситуации.)
1.Ежедневная уборка столовых – с использованием дезинфицирующих средств	Ежедневная уборка туалетов - с использованием дезинфицирующих средств
2.Соблюдение требований мытья кухонной и столовой посуды, инвентаря	Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) должен иметь сигнальную маркировку (красного цвета), использоваться по назначению и храниться отдельно от другого уборочного инвентаря.
3. Дезинфекция посуды и инвентаря - по эпидемиологическим показаниям (по режиму возбудителя)	
4.Для уборки каждой группы помещений (сырьевых цехов, горячего и холодного цехов, неохлаждаемых складских помещений, холодильных камер, вспомогательных помещений, санитарных узлов) - отдельный промаркированный уборочный инвентарь	
5.Уборка обеденного зала - после каждого приема пищи. Обеденные столы моют горячей водой с добавлением моющих средств, используя специально выделенную ветошь и промаркированную тару для чистой и использованной ветоши. Ветошь для мытья столов по окончании уборки замачивают в рабочем растворе дезинфицирующих средств.	Санитарно- техническое оборудование – ежедневное обеззараживание Ручки сливных бачков и ручки дверей протирают, а раковины, унитазы, сидения на унитазы чистят ершами или щетками, чистящими и дезинфицирующими средствами, разрешенными в установленном порядке.
5.Производственные столы в конце работы моют с использованием моющих и дезинфицирующих средств	
6.Санитарную обработку технологического оборудования - ежедневно по окончании работы.	В туалетных помещениях мыло, туалетная бумага и полотенца должны быть в наличии постоянно
7.Ветошь в конце работы замачивают в воде при температуре не ниже 45 °С, с добавлением моющих средств, дезинфицируют или кипятят, ополаскивают, просушивают и хранят в таре для чистой ветоши.	
8.Генеральная уборка техническим персоналом (без привлечения труда обучающихся) проводится с применением разрешенных моющих и дезинфицирующих средств.	

-Дезинфицирующие растворы для мытья полов готовят перед непосредственным применением в туалетных комнатах в отсутствие обучающихся.

- Дезинфицирующие и моющие средства хранят в упаковке производителя, в соответствии с инструкцией, и в местах, недоступных для обучающихся.

Режим дезинфекционной обработки при БАКТЕРИАЛЬНЫХ инфекциях И ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРКЕ

№ п/п	Объект обеззараживания	Способ обеззараживания	<u>«Дез-Хлор»</u>			<u>«Индилайт»</u>		
			Концентрация раствора в %	Кол-во средства на 10 л воды в мл	Время обеззараживания мин,	Концентрация раствора в %	Кол-во средства на 10 л воды в табл.	Время обеззараживания мин,
1	Поверхности в помещениях (пол, стены и др.), предметы обстановки	Протирание или орошение	0,1	10	60	0,015	1	60
			0,3	30	30	0,03	2	30
			0,5	50	15			
2	Посуда без остатков пищи	Погружение	0,1	10	30	0,015	1	15
			0,2	20	15			
4	Санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины, унитазы)	2-х кратное протирание или орошение с интервалом 15 мин	0,1	10	60	0,03	2	120
			0,25	25	30			
			0,4	40	15			
5	Уборочный инвентарь-швабры, ветошь, щетки	Замачивание протирание погружение	0,5	50	90	0,2	14	120
			1,0	100	60			
			1,5	150	30			
			2,0	200	15			
			<u>Срок годности рабочих растворов - 14 суток.</u> Смывание рабочего раствора средства с обработанных поверхностей после дезинфекции не требуется			<u>Срок годности рабочих растворов средства – 6 суток.</u> По окончании дезинфекции- влажная уборка, помещение проветривают; паркетный пол, деревянную мебель протирают сухой ветошью		

Режим дезинфекционной обработки дез. средствами при ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ

№ п/п	Объект обеззараживания	Способ обеззараживания	Наименование дезинфицирующего средства					
			<u>«Дез-Хлор»</u>			<u>«Индилайт»</u>		
			Концентрация раствора в %	Количество средства на 10 л воды в мл	Время обеззараживания мин,	Концентрация раствора в %	Количество средства на 10 л воды в табл.	Время обеззараживания в мин
1	Поверхности в (пол, стены, предметы обстановки)	Протирание или орошение	0,5	10	60	0,015	1	60
			1,0	100	30	0,03	2	30
			1,5	150	15			
2	Посуда без остатков пищи	Погружение	0,2	20	60	0,015	1	15
			0,4	40	30			
			1,0	100	15			
4	Санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины, унитазы)	2-х кратное протирание или орошение с интервалом 15 мин	1,5	150	60	0,03	2	120
			2,0	200	30	0,06	4	60
			2,5	250	15			
5	Уборочный инвентарь-швабры, ветошь, щетки	Замачивание, протирание, погружение	0,5	50	90	0,2	14	120
			1,0	100	60	0,3	20	60
			1,5	150	30			
			<u>Срок годности рабочих растворов - 14 суток.</u> Смывание рабочего раствора средства с обработанных поверхностей после дезинфекции не требуется. Средство несовместимо с мылами			<u>Срок годности рабочих растворов средства –6 суток.</u> По окончании дезинфекции- влажная уборка; помещение проветривают; паркетный пол, деревянную мебель протирают сухой ветошью		

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ДЕЗИНФЕКЦИОННЫМИ СРЕДСТВАМИ

«Дез-хлор» –

- К работе со средством не допускаются лица с повышенной чувствительностью к хлору, аллергическими заболеваниями и хроническими заболеваниями легких и верхних дыхательных путей.
- При работе со средством следует избегать его попадания на кожу и в глаза.
- Все работы со средством следует проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.
- Все виды работ с растворами от 0,015% до 0,06% концентрации активного хлора можно проводить без средств защиты органов дыхания.
- При работе с растворами способом протирания, содержащими от 0,1% активного хлора и выше, для защиты органов дыхания следует использовать универсальные респираторы типа РУ- 60М или РПГ-67 с патроном марки В, глаза защищать герметичными очками.
- Обработку поверхностей в помещениях следует проводить в отсутствие больных. По окончании дезинфекции следует провести влажную уборку и проветривание до исчезновения запаха хлора. **Дезинфекцию поверхностей способом протирания растворами, содержащими 0,015% активного хлора, можно проводить в присутствии больных.**
- Обработку посуды, белья, игрушек, уборочного инвентаря и коррозионно-стойких изделий медицинского назначения способами погружения и замачивания рекомендовано проводить в проветриваемом помещении, а все емкости закрывать крышками.
- Средство следует хранить отдельно от других лекарственных средств, в местах недоступных детям в плотно закрытой упаковке фирмы-изготовителя.

«Индилайт»

- При приготовлении рабочих растворов необходимо избегать попадания средства на кожу и в глаза.
- Работу со средством проводить в резиновых перчатках.
- **Дезинфекцию способом протирания возможно проводить в присутствии людей без средств защиты органов дыхания.**
- **Обработку поверхностей** растворами средства **способом орошения** проводить в отсутствие пациентов, используя средства защиты органов дыхания. После обработки неветилируемых помещений способом орошения рекомендуется проветривание в течение 15 минут.
- Емкости с раствором средства должны быть закрыты.
- При проведении работ со средством следует строго соблюдать правила личной гигиены. После работы вымыть лицо и руки с мылом.
- Хранить средство следует в местах, недоступных детям, отдельно от пищевых продуктов и лекарственных веществ.

МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

- При попадании средства в глаза немедленно промыть их проточной водой в течение 10-15 минут.
- При несоблюдении мер предосторожности возможно раздражение верхних дыхательных путей (Ника хлор). Пострадавшего удаляют из рабочего помещения на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение, рот и носоглотку прополаскивают водой, дают теплое питье (молоко или «Боржоми»).

- При попадании средства на кожу обильно промыть пораженное место водой и смазать ее смягчающим кремом.
- При случайном попадании средства в глаза обильно промыть их водой и закапать 30% раствор сульфацила натрия.
- .При попадании средства в желудок дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля. При необходимости обратиться к врачу.