

Как не пропустить туберкулез

ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ, ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ХОТЯ БЫ ДВА ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СИМПТОМОВ:

кашель
с выделением
мокроты более 3 недель



слабость

боль в груди
при дыхании



повышенная
потливость
(особенно ночью)

кровохарканье



снижение
веса,
не связанное
с диетой



температура более 37,5,
сохраняющаяся
длительное время



Прививки детям Туберкулез



Схема вакцинации

V – новорожденным на 3 - 7-й день жизни
RV – в 6 - 7 лет (при отрицательном
результате пробы Манту)

**На протяжении всего детства
ежегодно проводится
туберкулинодиагностика:**

- до 7 лет - реакция Манту (туберкулин)
- с 8 лет до 17 лет включительно – Диаскинтест



Основная цель вакцинации - предупреждение наиболее тяжелых форм детского туберкулеза. У инфицированных туберкулезом детей нередкой формой болезни является туберкулезный менингит, или менингоэнцефалит – болезнь практически со 100% летальностью

Регулярное обследование на туберкулез гарантирует раннее выявление и своевременное лечение заболевания.

Прививкам от туберкулеза детям с 12 месяцев 1 раз в год проводится проба Манту или Диаскинтест (8-14 лет).

Непрививкам от туберкулеза детям и детям с некоторыми хроническими заболеваниями проба Манту проводится 2 раза в год с 6-месячного возраста.

Взрослым и подросткам с 15 лет ежегодно проводится флюорография.

Туберкулез излечим!

Чем раньше выявлен туберкулез, тем быстрее и успешнее будет лечение.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиенического образования населения» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
г. Москва, 1-й Смоленский пер., д. 9, стр. 1
e-mail: cgon@cgon.ru;
тел.: 8 (499) 241 86 28



ТУБЕРКУЛЕЗ



Туберкулез

широко распространенное инфекционное заболевание.

Пути передачи - преимущественно воздушно-капельный, реже - воздушно-пылевой, контактный, алиментарный, вертикальный.

Источник инфекции – больные активной формой туберкулеза.

Заразиться туберкулезом может любой человек, но наиболее подвержены инфицированию дети до 3 лет, лица, проживающие на одной территории с больными туберкулезом органов дыхания, люди с хроническими заболеваниями, страдающие алкоголизмом, курильщики, беженцы, мигранты.



Возбудитель - микобактерия туберкулеза.

<http://cgon.rospotrebnadzor.ru/>

Симптомы

При развитии активного туберкулеза легких возможны следующие симптомы: кашель, продолжающийся 3 или более недель, кровохарканье, боли в груди во время дыхания, при кашле, потеря аппетита, потеря веса, усталость, лихорадка, озноб, ночная потливость.

Туберкулез может поражать и другие органы и системы организма: почки, позвоночник, суставы, головной мозг и другие.

В таком случае симптомы заболевания будут соответствовать локализации процесса.

Туберкулез может протекать бессимптомно или с минимальными симптомами.



<http://cgon.rospotrebnadzor.ru/>

Осложнения

Легочный плеврит, пневмоторакс, туберкулезный лимфаденит, туберкулез верхних дыхательных путей, венозная тромбоэмболия, септический шок и другие.

Наиболее действенный метод профилактики туберкулеза – вакцинация на 3-7 день жизни ребенка.

Ревакцинация проводится в 6-7 лет при отрицательной пробе Манту.

В месте введения противотуберкулезной вакцины спустя 4-6 недель развивается специфическая реакция в виде папулы размером 5-10 мм в диаметре.

Далее образуется рубчик до 10 мм в диаметре.

