

ПРИВИВКА-ДОСТУПНАЯ ЗАЩИТА ОТ ГРИППА

Для иммунизации достаточно одной прививки, которую необходимо проводить до подъема заболеваемости, чтобы успел сформироваться прочный иммунитет, защищающий от гриппа.

Обычно иммунитет формируется в течение 2–3 недель.



Кто имеет высокий риск заболеть пневмококковой инфекцией?

дети младше 2 лет
недоношенные дети

Взрослые старше 60 лет

Лица с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, печени, почек, сахарным диабетом, бронхиальной астмой

Дети, находящиеся на искусственном или смешанном вскармливании

Пациенты с иммунодефицитными состояниями, длительно получающие иммуносупрессивную терапию

Лица, находящиеся в организованных коллективах (ясли, детские сады, воинские части, интернаты)

Пациенты, перенесшие ранее острый средний отит, менингит, пневмонию



СХЕМЫ ВАКЦИНАЦИИ:

1. Все новорожденные: двукратно в 2 мес и 4,5 мес, ревакцинация в 15 мес
2. Ранее не привитые дети 3-11 месяцев:
2-кратно (интервал 4-8 нед), ревакцинация через 4-6 мес от второй прививки
3. Ранее не привитые дети 12-24 месяцев:
2-кратно (интервал не менее 8 нед), ревакцинация не проводится
4. Дети 2-5 лет и взрослые из групп риска однократно



Грипп - массовая и грозная инфекция, не щадящая ни детей, ни взрослых. Несмотря на успехи медицины и усилия врачей, от гриппа и его осложнений ежегодно в мире погибают люди, в том числе и в нашей республике.

от ГРИППА вас защитит

ПРИВИВКА

ПО ДАННЫМ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ПРИВИВКА ДАЕТ НАДЕЖНУЮ ЗАЩИТУ ОТ ЭПИДЕМИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ПОДТИПОВ ВИРУСА ГРИППА И МАССОВО СНИЖАЕТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ.

НА ФОРМИРОВАНИЕ ИММУНИТЕТА ПРОТИВ ГРИППА УХОДИТ от 2-х до 4-х НЕДЕЛЬ, ПОЭТОМУ ОПТИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ - СЕНТЯБРЬ - НОЯБРЬ.

ВНИМАНИЕ! Прививке обязательно должен предшествовать врачебный осмотр. Только врач определяет, нет ли у вас противопоказаний к иммунизации, и направляет на прививку.

**ПРИВИТЬСЯ МОЖНО В УЧРЕЖДЕНИЯХ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА.**



ЧТОБ ОТ ГРИППА НЕ СВАЛИТЬСЯ - НАДО ВОВРЕМЯ ПРИВИТЬСЯ!

- Для иммунизации достаточно одной прививки, которую необходимо проводить до подъема заболеваемости, чтобы успел сформироваться прочный иммунитет, защищающий от гриппа.
- Обычно иммунитет формируется в течение двух-трех недель.





ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ!

ЕСТЬ ЛИ У ВАС РИСК РАЗВИТИЯ ПНЕВМОКОККОВОЙ ПНЕВМОНИИ?



Вам 65 лет или больше?^{1,2}

Да ☒

Нет ☐

высокий риск²



Вы курите?

Да ☒

Нет ☐

риск выше
в 4,4 раза^{1,2}



У Вас хронические заболевания легких?

Да ☒

Нет ☐

риск выше
в 9,8 раза^{1,2}



У Вас сердечно-сосудистые заболевания?

Да ☒

Нет ☐

риск выше
в 4,2 раза^{1,2}



У Вас сахарный диабет?

Да ☒

Нет ☐

риск выше
в 3 раза^{1,2}



У Вас хронические заболевания печени?

Да ☒

Нет ☐

риск выше
в 5,8 раз^{1,2}



У Вас хронические заболевания почек?

Да ☒

Нет ☐

риск выше
в 4,2 раза^{1,2}



У Вас иммунодефицитное состояние?

Да ☒

Нет ☐

риск выше
в 5,8 раз^{1,2}


Если Вы ответили «ДА» хотя бы на 1 вопрос, спросите врача о вакцинации против пневмококковой инфекции.

Если Вы ответили «ДА» на 2 и более вопросов – у Вас существенно повышен риск развития пневмококковых инфекций.

ПНЕВМОНИЯ И ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ

ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ вызывается бактерией *S.pneumoniae* (пневмококком) и может проявляться в виде менингита, сепсиса, пневмонии^{1,2,3}


Пневмококк передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Источником инфекции могут стать как больные люди, так и здоровые носители



Каждый **ДЕСЯТЫЙ** пациент с тяжелой пневмонией **УМИРАЕТ**⁴

Практически каждый **ПЯТЫЙ** пациент с пневмонией **ИМЕЕТ ОСЛОЖНЕНИЯ СО СТОРОНЫ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ**⁵

Каждый год в мире
600-800
ТЫСЯЧ ВЗРОСЛЫХ
умирают от пневмококковой
инфекции⁶



ДО 76% ВСЕХ ПНЕВМОНИЙ ВЫЗВАНЫ ПНЕВМОКОККОМ⁷

Вакцинация – самый безопасный и эффективный способ защитить себя от пневмококковой инфекции!^{1,8,9}

Вакцинация проводится в специализированных медицинских учреждениях по рекомендации врача.



Узнайте больше на сайте:
<http://www.yaprivit.ru/>



Ссылки: 1. Centers for Disease Control and Prevention. Pneumococcal Disease: Fast Facts. <http://www.cdc.gov/pneumococcal/about/facts.html>. 2. Centers for Disease Control. Pneumococcal Disease, Risk Factors and Transmission. <http://www.cdc.gov/pneumococcal/about/risk-transmission.html>. 3. World Health Organisation. Pneumococcal vaccines Position Paper. Weekly Epidemiological record. 2012. 87; 129-144. 4. Чычанев А.Г. Пневмония: актуальная проблема медицины XXI века. Пульмонология. 2015; 25(2):133-142. 5. Corrales-Medina, V.F. Association between Hospitalization for Pneumonia and Subsequent Risk of Cardiovascular Disease. JAMA 2019; 313: 264-274. 6. Namaitijiang Maimaiti, Zafar Ahmed et al. Clinical Burden of Invasive Pneumococcal Disease in Selected Developing Countries/ Elsevier/ Value In Health Regional Issues 2 (2013) 259-263 <file:///C:/Users/strucs/Desktop/dx.doi.org/10.1016/j.vhri.2013.07.003>. 7. Федеральные клинические рекомендации «Вакцинопрофилактика пневмококковой инфекции», МЗ РФ, профильная комиссия по эпидемиологии, 14.04.2015. 8. Bonten, M.J.M et al. Polysaccharide Conjugate Vaccine against Pneumococcal Pneumonia in Adults. The new England Journal of Medicine 2015; 372:1114-26. 9. WHO 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine: WHO position paper. Wkly Epidemiol Rec. 2008;83:373-84.

ООО «Пфайзер»: 123317, Москва, Пресненская наб., д. 10, БЦ «Башня на Набережной» (Блок С)
Телефон: +7 (495) 287-50-00, Факс: +7 (495) 287-53-00

НОЯБРЬ, 2015

WRUPRALE15032

ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ



Пневмококковая инфекция — группа различных по клиническим проявлениям заболеваний, обусловленных пневмококком.

Заболевание вызывают бактерии — пневмококки (*Streptococcus pneumoniae*).



ОСНОВНОЙ ПУТЬ ЗАРАЖЕНИЯ
ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНЫЙ.
ЧАЩЕ ВСЕГО БОЛЕЮТ ДЕТИ
ДО 5 ЛЕТ И ЛИЦА СТАРШЕ 65 ЛЕТ.



ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ОТ 1 ДО 3 ДНЕЙ.
ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ ПРОЯВЛЯЕТСЯ МНОЖЕСТВОМ
РАЗЛИЧНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ ФОРМ:



ПНЕВМОНИЯ
(воспаление легких)



ГНОЙНЫЙ МЕНИНГИТ
(воспаление оболочек мозга)



БРОНХИТ
(воспаление бронхов)



ОТИТ
(острое воспаление среднего уха)



СИНУСИТ
(воспаление пазух носа)



СЕПСИС
(заражение крови)



ЭНДОКАРДИТ
(воспаление внутренней оболочки сердца)



АРТРИТ
(воспаление суставов)