

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА



КУЛЛАНУЧЫЛАР ХОКУКЛАРЫН ЯКЛАУ ҺӘМ КЕШЕ ИМНИЛЕГЕН
САКЛАУ ӨЛКӘСЕНДӘ КҮЗӘТЧЕЛЕК БУЕНЧА ФЕДЕРАЛЬ ХЕЗМӘТ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)

КУЛЛАНУЧЫЛАР ХОКУКЛАРЫН ЯКЛАУ ҺӘМ КЕШЕ
ИМНИЛЕГЕН САКЛАУ ӨЛКӘСЕНДӘ КҮЗӘТЧЕЛЕК ИТУ
ФЕДЕРАЛЬ ХЕЗМӘТЕНЕҢ ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ (ТАТАРСТАН) БУЕНЧА ИДАРӘСЕ

(Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан))

Территориальный отдел в Нурлатском,
Аксубаевском, Алькеевском, Черемшанском
районах (Нурлатский территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по Республике
Татарстан)

Нурлат, Аксубай, Әлки, Чиремшан
районнарындагы
территориаль бүлек

423040, Республика Татарстан (Татарстан), Нурлатский район,
г. Нурлат, ул. Школьная, д. 10
Тел.: 8 (84345) 2-05-38

Мәктәб ур., 10 йорт, Нурлат, 423040

E-mail: rpn.nurlat@tatar.ru

№ _____
На № _____ от _____

Исх. №26/602 от 14.06.2023г.

Руководителям
Исполнительных комитетов
Муниципальных образований

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Республике Татарстан (Татарстан) в Нурлатском, Аксубаевском,
Алькеевском, Черемшанском районах (далее – ТО. Управления) просит
Вас оказать содействие в распространении данной информации на
Ваших официальных сайтах.

И.о. начальника ТО: _____

А.Ф.Абзалов

Исп. Абзалова И.Н.
8(84346)2-10-89

Столбняк. Простые правила профилактики

Столбняк - инфекционная болезнь, с контактным механизмом передачи возбудителя. Характеризуется поражением центральной нервной системы с тоническим напряжением скелетной мускулатуры и периодическими генерализованными судорогами. Развитие симптомов заболевания от нескольких часов до 1 месяца.

Восприимчивость людей высокая.

Возникает паралич мышц лица, затылка, груди, диафрагмы, спины, плеч и бёдер. Через 1-5 дней развиваются приступы судорог, боли в мышцах, затруднение глотания, дыхания, мочеиспускания.

При отсутствии своевременного лечения, в большинстве случаев смерть наступает от паралича дыхательной мускулатуры.

Пути передачи: травматический, с заражением через повреждённые кожные покровы и слизистые оболочки (раны, ожоги, отморожения), куда попадает возбудитель столбняка с частичками почвы, навоза и т.д.

Источники инфекции: травоядные животные, грызуны, птицы, в кишечнике которых пребывает возбудитель и с фекалиями широко рассеивается во внешней среде, длительно сохраняясь в почве. Споры возбудителя столбняка в почве могут сохраняться более 10 лет.

С целью предупреждения возникновения заболеваний столбняком необходимо вакцинироваться в плановом порядке.

Специфическая профилактика (иммунопрофилактика) проводится в виде плановой активной иммунизации детей и взрослых и экстренной профилактики столбняка.

Иммунизация начинается с младенческого возраста и продолжается на протяжении всей жизни с определенной периодичностью (для взрослых - каждые 10 лет).

Наличие прививок предупреждает развитие заболевания столбняком.

Экстренную профилактику столбняка проводят в медицинских организациях (травмпункт, травматологическое отделение, хирургический кабинет). При любых травмах и ранах с нарушением целостности кожных и слизистых оболочек, обморожениях и ожогах второй, третьей и четвертой степеней, укусах животных, проникающих повреждениях или оперативных вмешательствах на желудочно-кишечном тракте, у непривитых или лиц с неизвестным прививочным анамнезом, гангрене или некрозе тканей любого типа, абсцессах, карбункулах.

В целях профилактики столбняка необходимо своевременно получать прививки в поликлинике по месту жительства.

Своевременное проведение плановых профилактических прививок позволит предупредить такое смертельное заболевание, как столбняк!

Нурлатский территориальный отдел.