



Говоря о профилактических прививках, мы подчас забываем о том, что они обеспечивают здоровье не только настоящего поколения, но и будущих наших детей.

Полноценная иммунизация девочек и девушек обеспечивает их защиту от инфекционных заболеваний, а в дальнейшем - защиту и плода, и новорожденного, получившего антитела от матери в процессе рождения и с грудным молоком.

**ВАЖНО ЗНАТЬ!** Беременность не является противопоказанием к проведению вакцинации!

Если планируется беременность, и сведений о вакцинации нет, то за **3-6** месяцев необходимо провести вакцинацию против краснухи, кори, паротита (КПК).



## Чем опасны эти инфекции для беременной?

**Корь и краснуха** – повышают риск преждевременных родов и мертворождений.

**Эпидемический паротит**, перенесенный в I триместре беременности повышает риск смертности плода.

**Ветряная оспа - опасна**, как для самой женщины, так и для плода, может вызвать патологию зрения, а также задержку умственного и физического развития плода.

**Гепатита В** - приводит к хроническим заболеваниям печени, с последующим развитием цирроза и рака печени.

Вакцина против гепатита В может быть рекомендована только женщинам, входящим в группу высокого риска по инфицированию гепатитом В (если опасность заражения исходит от кого-то из близких).

**Грипп** - большинство летальных исходов наблюдается в III триместре беременности.

*Ежегодная вакцинация беременных против гриппа не имеет противопоказаний, не оказывает негативного влияния ни на состояние беременной, ни на плод и проведённая во II и III триместрах беременности обеспечивает детям первых месяцев жизни эффективную защиту против гриппа.*