

**ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ЦИКЛУ:
«ОКАЗАНИЕ ПЕРВИЧНОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ МЕДИКО – САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
НАСЕЛЕНИЮ»**

1. Показанием для дуоденального зондирования является:
 1. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки
 2. Острый аппендицит
 3. Приступ желчно-каменной болезни
 4. Хронический холецистит
2. В этиологии первичных бактериальных пневмоний ведущая роль принадлежит:
 1. Вирусам
 2. Пневмококкам
 3. Стафилококкам
 4. Кишечной палочке
3. Усиленный блеск глаз характерен:
 1. Для гипотериоза
 2. Для тиреотоксикоза
4. Хронический гастрит а (с секреторной недостаточностью) чаще приводит к развитию:
 1. Язвенной болезни желудка
 2. Рака желудка
 3. Полипа желудка
5. Назовите сочетания факторов, характерных для ибс:
 1. Гиперхолестеринемия, наследственность, курение
 2. сахарный диабет, гипертоническая болезнь
 3. Ожирение, гиподинамия, стрессы
 4. Поллиноз, недостаточность митрального клапана, инфекция
6. Основные признаки сахарного диабета по данным лабораторного исследования:
 1. Низкий удельный вес мочи
 2. Высокий удельный вес мочи
 3. Появление сахара в моче
 4. Гипергликемия
7. Клинически острая левожелудочковая сердечная недостаточность проявляется:
 1. Сердечной астмой
 2. Отеком легких
 3. Коллапсом
 4. Обмороком
8. На частоту и время развития анафилактического шока влияет:
 1. Путь введения аллергена в организм
 2. Доза аллергена
9. Проба зимницкого проводится для определения:
 1. Сахара в моче
 2. Диастазы в моче
 3. Концентрационной и выделительной функции почек
 4. Форменных элементов
10. К "группе риска" по туберкулезу относятся:
 1. Одинокое люди старческого возраста
 2. Больные принимающие гормоны
 3. Больные сахарным диабетом
 4. Больные гипертонической болезнью
11. Причиной острого гастрита является:
 1. Прием недоброкачественной пищи
 2. Курение
 3. Стрессы
 4. Нерегулярное питание
12. Указывает ли темная кровь: сгустками типа "кофейной гущи" на легочное кровотечение:
 1. Да
 2. Нет
13. Сочетание каких факторов является первостепенным при возникновении ревматизма:
 1. Стрептококковая инфекция + профессия

2. Стрептококковая инфекция + наследственный фактор
3. Стрептококковая инфекция + тяжелый физический труд
14. Пиелонефритом чаще страдают:
 1. Подростки
 2. Женщины
 3. Мужчины
15. Перед введением стерильный масляный раствор необходимо подогреть до температуры (в град. С)
 1. 40
 2. 38
 3. 34
 4. 28
16. Для геморрагических диатезов главным симптомом является:
 1. Слабость
 2. Лихорадка
 3. Боли в суставах
 4. Кровоточивость
 5. Увеличение селезенки
17. Характерный признак паренхиматозного кровотечения:
 1. Истечение крови постоянной темной струей
 2. Истечение крови пульсирующей струей
 3. Истечение крови каплями
 4. Кровоточит вся раневая поверхность
18. Осложнения гипертонического криза II типа:
 1. Инфаркт миокарда
 2. Инсульт
 3. Коллапс
 4. Нефроангиосклероз
 5. Острая левожелудочковая недостаточность
19. При ревматизме медикаментозное лечение включает:
 1. Антибиотики
 2. Неспецифические противовоспалительные препараты
 3. Бронхолитики
 4. Спазмолитики
20. Для хронического холецистита характерны:
 1. Горечь во рту
 2. Запоры
 3. "дегтеобразный" стул
 4. Метеоризм
21. Усиленный блеск глаз характерен:
 1. Для гипотериоза
 2. + для тиреотоксикоза
22. Симптом наиболее характерный для клиники неспецифического язвенного колита:
 1. Резкая боль в животе
 2. Жидкий стул
 3. Частые, кровянистые испражнения
23. Туберкулез - это заболевание:
 1. Острое инфекционное
 2. Хроническое инфекционное
 3. Аллергическое
 4. Хроническое инфекционно-аллергическое
24. Больному пиелонефритом рекомендуется:
 1. Ограничение жидкости
 2. Обильное питье
 3. Нормальное количество жидкости
25. Побочным действием нитратов является:
 1. Гипертензия
 2. Гипотония
 3. Бронхоспазм
 4. Брадикардия

26. Обморок может развиваться в следствие:
1. Эмоций
 2. При испуге
 3. длительного неподвижного состояния
 4. длительного пребывания в душном помещении
27. Какие боли характерны для непроходимости кишечника:
1. Постоянные
 2. Кинжальные
 3. Схваткообразные
 4. Ноющие
 5. Опоясывающие
28. Для лечения пиелонефрита чаще используют:
1. Гентамицин
 2. Фурадонин
 3. Цитостатики
 4. Курантил
 5. Нитроксалин
29. Назовите наиболее информативный метод диагностики при пороках сердца:
1. ЭКГ
 2. Рентгенография органов грудной клетки
 3. Эхокардиография
30. Сочетание симптомов, характерных для гипотиреоза:
- 1 тахикардия + бронхоспазм + гипертония
 - 2 брадикардия + сонливость + гипотония
 - 3 брадикардия + резкая возбудимость + гипертония
31. При несахарном диабете имеется абсолютный дефицит:
- 1 глюкагона
 - 2 антидиуретического гормона
 - 3 тиреотропного гормона
 - 4 фолликулина
 - 5 катехоламинов
32. Инсулин назначают при:
- 1 i типе сахарного диабета
 - 2 ii типе сахарного диабета
33. Выбором лечения при v12 анемии является:
- 1 препараты железа
 - 2 витамин с
 - 3 витамин v12
34. Специфическую профилактику туберкулеза проводят с помощью:
- 1 гамма-глобулина
 - 2 вакцины бцж
 - 3 пробы манту
 - 4 пробы пирке
35. При заболеваниях органов дыхания показаны отвары:
- 1 цветов фиалки, багульника, термопсиса, алтея
 - 2 череды, толокнянки, клюквы
 - 3 чистотела, пижмы
36. При попадании 10% хлорида кальция в ткани развивается осложнение
- 1 тромбоз
 - 2 некроз
 - 3 абсцесс
 - 4 гепатит
37. Противопоказание для промывания желудка
- 1 отравление грибами
 - 2 желудочное кровотечение
 - 3 отравление алкоголем
 - 4 эндогенная интоксикация азотистыми шлаками
38. К острой коронарной недостаточности относится:
- 1 отек легких

- 2 сердечная астма
 - 3 коллапс
 - 4 стенокардия
 - 5 острый инфаркт миокарда
39. К абсолютным показаниям к оперативному лечению относятся:
- 1 перфорация язвы
 - 2 профузное желудочное кровотечение
 - 3 язвенная болезнь в активной фазе
40. Уменьшение выделения мочи:
- 1 анурия
 - 2 олигурия
41. Для оказания неотложной помощи при гипертоническом кризе I типа чаще используют:
- 1 нифедипин
 - 2 сердечные гликозиды
 - 3 кофеин
 - 4 каптоприл
 - 5 анаприлин
42. Неотложная помощь при стенокардии:
- 1 нитроглицерин под язык
 - 2 кровопускание
 - 3 горчичник на область сердца
 - 4 сердечные гликозиды
 - 5 нитроминт (аэрозоль)
43. При гипогликемической коме:
- 1 кожные покровы влажные
 - 2 чувство голода
 - 3 дрожь в теле
 - 4 дыхание куссмауля
44. Напряжение мышц и положительный симптом щеткина-блюмберга в правой подвздошной области бывают при:
- 1 остром аппендиците
 - 2 непроходимости кишечника
 - 3 ущемленной грыже
 - 4 остром холецистите
 - 5 перфоративной язве
45. Назовите несомненный признак проникающего ранения живота:
- 1 рана на передней стенке
 - 2 выпадание в рану сальника или петли кишки
 - 3 боль и кровотечение из раны
 - 4 напряжение брюшной стенки и наличие раны
46. Помощь при приступе стенокардии (а/д 120/70 мм.ед.):
- 1 нитроглицерин под язык
 - 2 капли зеленина 15 капель
 - 3 подкожно 0,1% - 1,0 атропин
 - 4 изоптин 1 таб. Внутрь
 - 5 нитроминт (аэрозоль)
47. При нарастающем клапанном пневмотораксе в порядке оказания первой помощи надо:
- 1 обработать рану йодом, наложить бинтовую повязку
 - 2 произвести пункцию плевральной полости толстой иглой с разрезанным пальцем резиновой перчатки
 - 3 ввести обезболивающее (морфий)
 - 4 транспортировать лежа на спине
48. Для остановки артериального кровотечения можно применять:
- 1 тугую повязку
 - 2 жгут
 - 3 давящую повязку
 - 4 ремень
 - 5 косыночную повязку
49. Характерный признак венозного кровотечения:
- 1 истечение крови постоянной темной струей

- 2 истечение крови пульсирующей струей
 - 3 истечение крови каплями
 - 4 кровоточит вся раневая поверхность
50. Неотложная помощь больным на догоспитальном этапе при желудочных кровотечениях:
- 1 промыть желудок, дать кусочки льда, срочно госпитализировать
 - 2 строгий постельный режим, холод на эпигастрий, введение дицинона, и срочно госпитализировать
 - 3 холод на живот, введение дицинона, сердечных и сосудосуживающих средств и срочно госпитализировать
51. Время выдержки при паровом методе стерилизации при 132 град.с:
- 1 20 минут
 - 2 30 минут
 - 3 45 минут
 - 4 60 минут
52. Правильные варианты стерилизации шовного материала:
- 1 обработка в 96 градусном спирте и хранение в нем
 - 2 обработка и хранение в 70 градусном спирте
 - 3 стерилизация паровым методом и хранение в упаковочном материале
 - 4 стерилизация в 4,8% растворе Первомура
53. Растворы, используемые для обработки слизистых при их загрязнении кровью:
- 1 70% спирт
 - 2 96% спирт
 - 3 раствор альбуцида
 - 4 0,05% раствор марганцево-кислого калия
 - 5 3% раствор перекиси водорода
54. Длительность использования 0,5% моющего раствора:
- 1 сутки
 - 2 на одну партию инструментов
 - 3 3 суток
 - 4 1 сутки, если раствор не изменит цвет
55. Время замачивания в 0,5% моющем растворе изделий медицинского назначения при проведении предстерилизационной очистки:
- 1 10 минут
 - 2 5 минут
 - 3 15 минут
56. Меры профилактики, которые необходимо соблюдать при проведении искусственного дыхания методом "рот в рот":
- 1 использование мундштука или носового платка
 - 2 непосредственно рот в рот
57. Сроки хранения стерильного материала в закрытых биксах:
- 1 7 суток
 - 2 1 сутки
 - 3 3 суток
 - 4 20 суток
58. Причины смерти больных, страдающих Спидом:
- 1 приобретенный иммунодефицит
 - 2 оппортунистические инфекции
 - 3 опухолевые процессы
 - 4 сепсис
59. Время дезинфекции 2% раствором Виркона изделий из металла:
- 1 30 минут
 - 2 10 минут
 - 3 60 минут
60. Время воздействия антисептика на кожу рук в целях профилактики заражения Вич:
- 1 2 минуты
 - 2 5 минут
 - 3 10 минут
 - 4 сразу смыть под проточной водой с мылом

