

## Охрана здоровья сельского населения (ф-р фап)

1. Показаниями к госпитализации больных с гипертонической болезнью являются:
  - а) впервые возникший гипертонический криз
  - б) Осложненный гипертонический криз
  - в) Некупирующийся гипертонический криз
  - г) Отсутствие эффекта от амбулаторного лечения артериальной гипертензии в течение 3-5 дней
2. При лечении клофеллином наблюдаются:
  - а) Синдром отмены
  - б) Гепатотоксическое действие
  - в) Сухость во рту
  - г) Задержка жидкости в организме
3. К острой коронарной недостаточности относится:
  - а) Отек легких
  - б) Сердечная астма
  - в) Коллапс
  - г) Стенокардия
  - д) Острый инфаркт миокарда
4. К атипичным формам инфаркта миокарда относятся:
  - а) Абдоминальная форма
  - б) Аритмическая форма
  - в) Гипертензивная форма
  - г) Астматическая форма
5. Признаками рахита являются:
  - а) Гипотония мышечной системы
  - б) Искривление костей нижних конечностей
  - в) Большой, не уместающийся во рту язык
  - г) Облысение затылка
  - д) Истончение подкожно-жирового слоя
  - е) Краниотабес
  - ж) Отставание в умственном развитии
6. Антигистаминные препараты не применяются водителям во время работы из-за:
  - а) Седативного действия на центральную нервную систему
  - б) Из-за атропиноподобного действия
7. Острый гломерулонефрит возникает преимущественно:
  - а) В детском возрасте от 5-15 лет
  - б) В возрасте 30-40 лет
  - в) В пожилом возрасте
  - г) В любом возрасте
8. После стационарного лечения в активной фазе ревматизма при наличии порока сердца бициллин-5 назначается:
  - а) В течение 3-х лет подряд
  - б) В течение 5-ти лет подряд
  - в) В течение 2-х лет подряд
  - г) Сезонно в течение 2-х лет
9. Ребенок самостоятельно сидит:
  - а) С 4-х месяцев
  - б) С 5-ти месяцев
  - в) С 6-ти месяцев
  - г) С 7-ми месяцев

д) С 8-ми месяцев

10. Угрозу жизни больного с анафилактическим шоком создают:

- а) Острая сосудистая недостаточность
- б) Желудочно-кишечный синдром
- в) Острая дыхательная недостаточность
- г) Кожный синдром
- д) Коматозная форма шока
- е) Кожные проявления шока

11. Осложнения сахарного диабета:

- а) Инсульт
- б) Инфаркт
- в) Гангрена
- г) Слепота
- д) Образование камней в почках

12. Анатомо-физиологическими особенностями дыхательной системы у детей раннего возраста являются:

- а) Узкие короткие носовые ходы
- б) Обильное кровоснабжение
- в) Пониженная эластичность легочной ткани
- г) Повышенная эластичность легочной ткани
- д) Повышенная воздушность легких

13. Рентгенологическим признаком рака желудка является:

- а) Симптом "ниши"
- б) Дефект наполнения
- в) Ускоренная эвакуация пищи из желудка
- г) Гипертрофия складок слизистой желудка

14. При пиелонефрите преимущественно поражаются:

- а) Клубочки
- б) Канальцы
- в) Чашечки
- г) Клубочки и канальцы

15. Боль при стенокардии длится:

- а) Более 30 минут
- б) До 5-10 минут, иногда 20 минут
- в) 2-3 часа
- г) часами, днями

16. Тактика при "бледной" лихорадке:

- а) Ребенка раздеть
- б) Грелка к ногам
- в) Согреть, напоить теплым чаем

17. Для крупозной пневмонии характерны:

- а) Острое начало, озноб, лихорадка
- б) Плевральные боли
- в) Ржавая мокрота со 2 дня
- г) Гнойная мокрота с первых дней

18. Угрожающим жизни осложнением обширной пневмонии может быть:

- а) Гипертонический синдром
- б) Легочное кровотечение

- в) Острая дыхательная недостаточность
- г) Некупирующийся болевой синдром

19. Признаки кишечной диспепсии:

- а) Отрыжка
- б) Рвота
- в) Неустойчивый стул
- г) Метеоризм

20. Самым ранним признаком хронического гепатита является синдром:

- а) Астено-вегетативный
- б) Геморрагический
- в) Желтушный
- г) Внепеченочные знаки

21. Подозрительны в отношении сахарного диабета склонность:

- а) К гнойным инфекциям
- б) К простудам
- в) Зуд половых органов
- г) Желтые пенистые бели

22. Ведущим симптомом инфекционно-токсического шока является:

- а) Бледность на фоне высокой температуры
- б) Заторможенность, вялость
- в) Прогрессирующее снижение а/д на фоне высокой температуры

23. Прикорм дается:

- а) До кормления грудью матери
- б) После кормления грудью матери

24. "механический ритм" болей в суставах характерен для:

- а) Артроза
- б) Ревматоидного артрита

25. Нормы глюкозы в крови

- а) 3,3-5,5 ммоль/л
- б) 4,4-6,6 ммоль/л

26. Особенности налета в зеве при дифтерии:

- а) Серо-грязный, трудно снимается, при снятии кровоточит
- б) Желтого цвета, легко снимается
- в) Белый крошкообразный, легко снимается

27. Переходит ли острый лейкоз в хронический:

- а) Нет
- б) Да
- в) Переходит не часто

28. При венозном кровотечении накладывается:

- а) Жгут
- б) Тугая повязка
- в) Давящая повязка
- г) Шина
- д) Повязка дезо

29. Для клиники нервно-артрического диатеза характерен синдром:

- а) Кожный

- б) Неврастенический
- в) Спастический

30. Тяжесть тиреотоксикоза определяется по изменениям:

- а) Глаз
- б) Центральной нервной системы
- в) Обмена веществ
- г) Вегетативной нервной системы
- д) Сердечно-сосудистой системы

31. Этиологическими факторами хронических гепатитов могут быть:

- а) Перенесенные вирусные гепатиты
- б) Алкоголь
- в) Токсические и лекарственные факторы
- г) Курение
- д) Ожирение

32. 5-ти летнему ребенку для промывания желудка необходимо воды в количестве:

- а) 1 литр
- б) 2 литров
- в) 3 литров
- г) 4 литров
- д) 5 литров
- е) 6 литров
- ж) 7 литров

33. Пониженный аппетит, неустойчивый стул с тенденцией к послаблению - характерны для гастрита:

- а) С пониженной секрецией
- б) С повышенной секрецией

34. Для больных хроническим некалькулезным холециститом характерны:

- а) Плохая переносимость жирной пищи
- б) Боли в правом подреберье
- в) Неустойчивость стула
- г) Горечь и сухость во рту
- Д) потеря массы тела

35. При гипогликемической коме после введения 40% глюкозы больной приходит в сознание:

- а) Нет
- б) Да

36. Бронхолитики занимают основное место в лечении:

- а) Астматического бронхита
- б) Гнойного бронхита

37. Угрожающим жизни осложнением обширной пневмонии может быть:

- а) Гипертонический синдром
- б) Легочное кровотечение
- в) Острая дыхательная недостаточность
- г) Некупирующийся болевой синдром

38. Для врожденных пороков сердца характерно:

- а) Рвота
- б) Отставание в физическом развитии
- в) Сухие хрипы в легких
- г) Грубый шум в сердце, проводящийся во все точки
- д) Боли в суставах
- е) Анемия

39. У пожилых чаще развивается:

- а) Сахарный диабет II типа
- б) Сахарный диабет I типа

40. Основной жалобой больных при эмфиземе легких является:

- а) Кашель
- б) Одышка
- в) Приступы удушья
- г) Гнойная мокрота
- д) Розовая мокрота

41. Цель предстерилизационной очистки:

- а) удаление белковых, жировых, механических загрязнений, остатков дезинфектанта и лекарственных средств;
- б) уничтожение патогенной и условно-патогенной микрофлоры;
- в) уничтожение всех видов микрофлоры, включая споры;
- г) уничтожение патогенных микроорганизмов.

42. Ориентировочные сроки ожидания развития внутрибольничных осложнений при хирургических вмешательствах:

- а) 30 суток от момента проведения оперативного вмешательства;
- б) 7 суток от момента выписки;
- в) 1 год;
- г) Без срока давности.

43. Медицинская сестра должна производить смену перчаток:

- а) После каждого пациента;
- б) После 5-6 манипуляций;
- в) После 3 пациентов;
- г) 1 раз в смену.

44. Дезинфекция, которая проводится с целью не допустить распространения возбудителей вби и их переносчиков в отделениях (палатах) из соседних отделений (палат):

- а) Очаговая;
- б) Плановая;
- в) Заключительная;
- г) По эпидемиологическим показаниям.

45. Группа дезинфицирующих средств - очень активные, обладают широким спектром бактерицидного и вирулицидного действия, высокоэффективны в отношении туберкулезной микобактерии и возбудителей особо опасных инфекций:

- а) альдегиды;
- б) производные спиртов;
- в) фенолсодержащие соединения;
- г) третичноаммониевые соединения.

46. Материалы, контактирующие с больными особо опасными инфекциями:

- а) Класс а;
- б) Класс б;
- в) Класс в;
- г) Класс г.

47. Внутрибольничное инфицирование вич может произойти:

- а) При переливании крови, трансплантации органов;
- б) При использовании некачественно обработанного инструментария;
- в) При аварийных ситуациях медицинских работников;
- г) Все перечисленное.

48. Режим паровой стерилизации для изделий из резин, латекса, отдельных видов пластмасс (полиэтилен высокой плотности, пвх-пластики), лигатурного шовного материала:

- а) 1,1 атм. 120с45 минут
- б) 2,0 атм. 132с20 минут
- в) 60 мин 180 с
- г) 150 мин 160с

49. При загрязнении перчаток медицинской сестры выделениями необходимо:

- а) Руки в перчатках обработать салфеткой с дезинфектантом, вымыть проточной водой, снять перчатки, руки вымыть и обработать антисептиком;
- б) Вымыть проточной водой, снять перчатки, руки вымыть и обработать антисептиком;
- в) Снять перчатки, руки вымыть и обработать антисептиком;
- г) Руки вымыть и обработать антисептиком.

50. При вскрытии стерильного бикса из трех контрольных тестов 1 не соответствует эталону. Какие действия должна совершить медсестра?

- а) Использовать стерильный материал в течение 1 часа;
- б) Отправить материал на повторную стерилизацию;
- в) Использовать материал из тех отделов бикса, где тест соответствует эталону;
- г) Материал расценивается как стерильный.

51. Артериальное давление (систолическое) в преагональном состоянии:

- а) Ниже 60 мм рт.ст.
- б) Ниже 80 мм рт.ст.
- в) Ниже 90 мм рт.ст.
- г) Ниже 120 мм рт.ст.
- д) Не определяется

52. Размер воздуховода определяется расстоянием:

- а) От правого глаза до кончика носа
- б) От носа до нижней губы
- в) От верхних резцов до подбородка

- г) От подбородка до мочки уха
- д) От угла рта до мочки уха

53.Какая степень ожога характеризуется появлением на коже пузырей, заполненных серозной жидкостью?

- а) 2
- б) 3а
- в) 3б
- г) 4
- д) 1

54.На стройке рабочий упал со 2-го этажа на торчащие из земли железные стержни, один из которых вонзился ему в живот. Необходимо:

- а) Срочно снять пострадавшего со стержня, закрыть рану и отправить в больницу
- б) Отпилить стержень, не извлекая его из брюшной полости, зафиксировать лейкопластырем к коже и срочно доставить в больницу
- в) Извлечь стержень, обезболить и, не закрывая раны, срочно доставить в больницу
- г) Извлечь стержень и срочно доставить в больницу
- д) Обезболить, по возможности, аккуратно извлечь стержень, закрыть рану асептической повязкой, на рану наложить холод

55.Укажите, с какого этапа начинают проводить слр:

- а) Обеспечение проходимости верхних дыхательных путей
- б) Искусственная вентиляция лёгких
- в) Непрямой массаж сердца
- г) Введение препаратов внутривенно
- д) Электрическая дефибриляция

56.Женщина пролила себе на ноги кипяток. Кожа на обеих голених и стопах гиперемирована, на коже пузыри, заполненные прозрачной жидкостью. Определите степень ожога и его площадь.

- а) 1 степень-18%
- б) 2 степень-18%
- в) 2 степень-9%
- г) 1 степень-9%
- д) -3степень - 4%

57.При оказании неотложной помощи больному с приступом сердечной астмы в стационаре необходимо:

- а) Вызвать врача
- б) Помочь занять положение ортопноэ
- в) Измерить ад, дать нитроглицерин
- г) Подать увлажнённый кислород
- д) Всё перечисленное верно

58. Венозный жгут при сдс перед извлечением пострадавшего из-под завала накладывается с целью:
- а) Остановки кровотечения
  - б) Уменьшения отёка конечности
  - в) Защиты кровеносных сосудов от разрыва
  - г) Разгрузки малого круга кровообращения
  - д) Предупреждения резкого поступления продуктов распада в кровеносное русло
59. Для II степени электротравмы характерно:
- а) Судорожное сокращение мышц без потери сознания
  - б) Судорожное сокращение мышц с потерей сознания
  - в) Судорожное сокращение мышц с потерей сознания и сердечными или легочными нарушениями
  - г) Клиническая смерть
  - д) Некроз тканей
60. В поликлинику с улицы доставили пожилую женщину, которая жалуется на сжимающую боль за грудиной, возникшую 40 минут назад. Женщина принимала нитроглицерин, но боль не уменьшалась. АД 100/60 мм рт.ст. Необходимо:
- а) Успокоить пациентку
  - б) Вызвать врача
  - в) - дать таблетку нитроглицерина (под контролем АД, если было принято менее 3 таб.)
  - г) Снять ЭКГ
  - д) Всё перечисленное верно