

Итоговое тестирование по циклу:

«ПМПП населению для процедурных и прививочных медицинских сестер»

1. Использованные ампулы из-под наркотических лекарственных средств:
 - 1) хранятся в сейфе отделения до уничтожения;
 - 2) сдаются главной медсестре;
 - 3) ежедневно сдаются главному врачу или его заместителю по лечебной работе;
 - 4) ежедневно уничтожаются в отделении.
2. БЦЖ:
 - 1) убитая вакцина;
 - 2) живая вакцина;
 - 3) рекомбинантная вакцина;
 - 4) ДНК - вакцина.
3. Температурный режим в холодильнике для хранения иммунологических препаратов контролируется:
 - 1) 1 раз в день;
 - 2) 1 раз в неделю;
 - 3) 2 раза в месяц;
 - 4) 2 раза в день.
4. Возможное осложнение при внутримышечной инъекции:
 - 1) инфильтрат;
 - 2) воздушная эмболия;
 - 3) тромбофлебит;
 - 4) кровотечение;
5. Кровь на биохимические анализы берется:
 - 1) утром натощак;
 - 2) после завтрака;
 - 3) в любое время суток;
 - 4) перед обедом.
6. Выберите шприц для введения больному сахарным диабетом инсулина, в котором 1мл содержит 40 МЕ:
 - 1) одноразовый шприц на 2 мл;
 - 2) инсулиновый шприц на 40 МЕ;
 - 3) одноразовый шприц на 1 мл;
 - 4) инсулиновый шприц на 100 МЕ.
7. Неоказание помощи пациенту - это...
 - 1) умышленное правонарушение;
 - 2) халатность медработника;
 - 3) несчастный случай;
 - 4) медицинская ошибка.
8. Иммунологические препараты с неясной или отсутствующей маркировкой на ампуле:
 - 1) могут использоваться без ограничения;
 - 2) подлежат списанию (уничтожению);
 - 3) могут использоваться по разрешению участкового врача;
 - 4) могут использоваться по разрешению главного врача.
9. Анатомическая область для введения гепарина:
 - 1) подкожно-жировой слой боковых сторон живота не более 2,5 см от пупка
 - 2) наружная боковая поверхность средней трети плеча
 - 3) передняя и переднебоковая поверхность бедра
 - 4) надлопаточная область
10. Правило наложения манжеты тонометра при измерении артериального давления:
 - 1) туго и плотно;
 - 2) чтобы между манжеткой и плечом проходил 2 пальца;
 - 3) манжетка накладывается на плотную одежду;
 - 4) не имеет значения.

11. Механическое выполнение своих обязанностей, с необыкновенной тщательностью, скрупулезностью, проявляя ловкость и умение – это характеристика медицинской сестры:
 - 1) сестра – рутенер;
 - 2) сестра – гренадер;
 - 3) сестра «играющая заученную роль»;
 - 4) сестра – эксперт.
12. Возможная причина гематомы:
 - 1) введение не подогретых масляных растворов;
 - 2) ошибочное введение раздражающего вещества;
 - 3) неправильный выбор места инъекции;
 - 4) неправильная техника выполнения инъекции.
13. Принцип группирования лекарственных средств, когда лекарственные средства применяются для лечения строго определенной болезни:
 - 1) по терапевтическому применению;
 - 2) по фармакологическому действию;
 - 3) по химическому строению;
 - 4) по нозологическому принципу.
14. Хранение иммунологических препаратов в прививочном кабинете осуществляется при температуре:
 - 1) $-2...+2$ 0С;
 - 2) $+2...+8$ 0С;
 - 3) $-2...+8$ 0С;
 - 4) $-2...-8$ 0С.
15. Длина иглы для внутримышечной инъекции (в мм):
 - 1) 60
 - 2) 40
 - 3) 30
 - 4) 10
16. Химические факторы риска в работе медицинской сестры:
 - 1) анестезирующие вещества;
 - 2) лекарственные препараты;
 - 3) ртуть;
 - 4) все перечисленное верно.
17. Местом внутримышечного введения лекарственных препаратов является:
 - 1) подлопаточная область;
 - 2) внутренняя поверхность предплечья;
 - 3) передняя брюшная стенка;
 - 4) дельтовидная мышца;
18. Нежелательные эффекты, возникающие при применении лекарственных средств в лечебных дозах:
 - 1) основное действие;
 - 2) побочное действие;
 - 3) кумуляция;
 - 4) токсическое действие;
19. Наркотические препараты выписываются на:
 - 1) латинском языке;
 - 2) русском языке;
 - 3) национальном языке;
 - 4) на русском и на национальном языках.
20. Невербальное средство общения:
 - 1) язык;
 - 2) речь;
 - 3) мышление;
 - 4) мимика, жесты.
21. Генеральную уборку в режимном кабинете проводит:
 - 1) медицинская сестра под руководством старшей сестры;
 - 2) санитарка под руководством медсестры;

- 3) медсестра с привлечением санитарки;
 - 4) санитарка под руководством сестры-хозяйки.
22. Гигиеническая антисептика рук медицинской сестры показана:
- 1) перед выполнением любых инъекций;
 - 2) перед раздачей пищи;
 - 3) перед измерением артериального давления;
 - 4) после посещения туалета.
23. Требования к дезинфектантам:
- 1) наличие сертификата качества и инструкции по применению средства на русском языке. Наличие регистрации препарата в ГОСТ – стандарте;
 - 2) класс токсичности дезинфектанта должен быть не ниже третьего (малотоксичны);
 - 3) в инструкции должно быть указание на разрешение применения в ЛПУ;
 - 4) все перечисленное верно.
24. Сбор отходов класса Б осуществляется:
- 1) в желтые пакеты или контейнеры с желтой маркировкой;
 - 2) в красные пакеты или контейнеры с красной маркировкой;
 - 3) цвет пакетов может быть любой, за исключением жёлтого и красного;
 - 4) в серые пакеты и контейнеры.
25. Физические методы стерилизации:
- 1) автоклавирование;
 - 2) воздушная стерилизация;
 - 3) плазменная стерилизация;
 - 4) все перечисленное верно.
26. Путь передачи характерен для вирусного гепатита А:
- 1) половой;
 - 2) инструментальный;
 - 3) вертикальный;
 - 4) водный.
27. Сбор отходов класса В осуществляется:
- 1) в желтые пакеты или контейнеры с желтой маркировкой;
 - 2) в красные пакеты или контейнеры с красной маркировкой;
 - 3) цвет пакетов может быть любой, за исключением жёлтого и красного;
 - 4) в серые пакеты и контейнеры.
28. В лабораторию кровь на ВИЧ должна быть доставлена после взятия не позднее:
- 1) 2 часов;
 - 2) 12 часов;
 - 3) 24 часов;
 - 4) 36 часов.
29. Медицинская сестра должна производить смену перчаток:
- 1) после каждого пациента;
 - 2) после 5-6 манипуляций;
 - 3) после 3 пациентов;
 - 4) 1 раз в смену.
30. Изделия медицинского назначения, подлежащие предстерилизационной очистке:
- 1) все изделия, подлежащие стерилизации;
 - 2) все изделия, прошедшие дезинфекцию;
 - 3) только изделия, имеющие видимые следы органических загрязнений;
 - 4) все металлические инструменты.
31. Дезинфекция, которая проводится с целью не допустить распространения возбудителей ВБИ и их переносчиков в отделениях (палатах) из соседних отделений (палат):
- 1) очаговая;
 - 2) плановая;
 - 3) заключительная;
 - 4) по эпидемиологическим показаниям.
32. Способ дезинфекции для проведения генеральной уборки:
- 1) способ погружения;
 - 2) способ орошения;

- 3) способ замачивания;
 - 4) способ засыпания.
33. Пути передачи вирусов гепатита В все, кроме:
- 1) половой;
 - 2) воздушно-капельный;
 - 3) парентеральный;
 - 4) вертикальный.
34. Медицинским работникам, осуществляющим сбор, обеззараживание, хранение, транспортирование медицинских отходов, категорически запрещается:
- 1) пересыпать собранные шприцы инъекционные однократного применения из одной тары в другую;
 - 2) утилизировать отходы шприцев инъекционных однократного применения руками;
 - 3) осуществлять сбор отходов шприцев инъекционных однократного применения без перчаток и спецодежды;
 - 4) все перечисленное верно.
35. После заполнения иглосъемника на $\frac{3}{4}$ объема иглы подлежат:
- 1) утилизации согласно группам отходов;
 - 2) уничтожению в мусорные баки;
 - 3) уничтожению на полигонах бытовых отходов;
 - 4) заполнению иглосъемника до полного объема.
36. Режим паровой стерилизации для изделий из резин, латекса, отдельных видов пластмасс (полиэтилен высокой плотности, ПВХ-пластикаты), лигатурного шовного материала:
- 1) 1,1 атм. 120С 45 минут
 - 2) 2,0 атм. 132С 20 минут
 - 3) 60 мин 180 С
 - 4) 150 мин 160С
37. Порядок мытья помещения при проведении генеральной уборки:
- 1) мебель, стены, пол, потолок;
 - 2) стены, потолок, пол, мебель;
 - 3) потолок, стены, мебель, пол;
 - 4) мебель, стены, потолок, пол.
38. В пределах какого времени можно использовать рабочий лоток со стерильным материалом в процедурном кабинете:
- 1) 2 часа;
 - 2) 3 часа;
 - 3) 30 минут;
 - 4) время не ограничено.
39. Физические методы стерилизации:
- 1) автоклавирование;
 - 2) воздушная стерилизация;
 - 3) плазменная стерилизация;
 - 4) все перечисленное верно.
40. Серонегативное окно после заражения ВИЧ инфекцией в среднем продолжается:
- 1) 3 недели;
 - 2) 3 месяца;
 - 3) 5-6 месяцев;
 - 4) 8-12 месяцев.
41. При использовании одноразовых контейнеров для острого инструментария допускается их заполнение в течение:
- 1) 24 часов;
 - 2) 48 часов;
 - 3) недели;
 - 4) 3-х суток.
42. При проведении дезинфекции использованного инструментария в емкости лежат инструменты с закрытыми замками, пробирки заполнены дезинфектантом до половины. Оцените работу медсестры:

- 1) замки должны быть открыты, пробирки полностью заполнены, стекло и металл должны дезинфицироваться отдельно;
 - 2) нарушила правила дезинфекции: стекло и металл должны дезинфицироваться отдельно;
 - 3) проводят дезинфекцию правильно;
 - 4) нарушила правила дезинфекции: пробирки должны быть заполнены полностью.
43. Количество инструментария подвергается контролю на качество ПСО:
- 1) вся обработанная партия инструментов;
 - 2) 1% от всей партии инструментов;
 - 3) 1% одновременно обработанных изделий каждого наименования, но не менее 3 единиц;
 - 4) по 1 инструменту от каждого наименования.
44. Стерилизация – это:
- 1) комплекс мероприятий, направленных на очистку инструментария от биологических и химических загрязнений;
 - 2) комплекс мероприятий, направленных на уничтожение всех форм микрофлоры, включая споры;
 - 3) комплекс мероприятий, направленных на уничтожение патогенных и непатогенных микроорганизмов;
 - 4) комплекс мероприятий, направленных на остановку развития патогенных микроорганизмов;
45. Путь передачи, при котором факторами передачи являются медицинский инструментарий, перевязочный материал, лекарственные препараты:
- 1) раневой;
 - 2) аэрогенный;
 - 3) парентеральный;
 - 4) вертикальный.
46. Медицинская деонтология — это наука о:
- 1) морали поведения;
 - 2) формах человеческого сознания;
 - 3) должном;
 - 4) профессиональном долге медицинских работников.
47. Ятрогения, возникшая в результате медикаментозного воздействия:
- 1) психогенная;
 - 2) фармакогенная;
 - 3) комбинированная;
 - 4) манипуляционная.
48. Нарушение установленных законом правил поведения и выполнения профессиональных обязанностей -это...
- 1) медицинская ошибка;
 - 2) медицинское правонарушение;
 - 3) несчастный случай;
 - 4) профессиональное заболевание.
49. Пассивная иммунизация:
- 1) введение антител для получения иммунного ответа в виде антигенов;
 - 2) введение антител к каким-либо антигенам;
 - 3) введение антигенов для получения иммунного ответа в виде антител;
 - 4) все перечисленное верно.
50. Энджерикс В, эувакс В, комбиотек – названия вакцин против:
- 1) туберкулеза;
 - 2) кори;
 - 3) гепатита В;
 - 4) гепатита А.
51. Искусственную вентиляцию легких проводят с частотой:
- 1) 10-20 вдохов в 1 минуту
 - 2) 16-18 вдохов в 1 минуту
 - 3) 1-2 вдоха в 1 минуту
 - 4) 9-12 вдохов в 1 минуту
 - 5) 18-20 вдохов в 1 минуту

52. При проведении непрямого массажа сердца у взрослого человека грудина должна прогнуться на:
- 1) 1-2 см
 - 2) 3-5 см
 - 3) 10 см
 - 4) 8 см
 - 5) 6 см
53. Основное действие медицинской сестры при отёке лёгких
- 1) введение адреналина
 - 2) введение клофелина
 - 3) подача кислорода через пеногаситель
 - 4) подача 100% увлажнённого кислорода
 - 5) укладывание пациента с приподнятым ножным концом
54. Для приступа бронхиальной астмы характерным симптомом является:
- 1) экспираторная одышка
 - 2) инспираторная одышка
 - 3) гиперемированное лицо, напряженные вены шеи
 - 4) пенная мокрота розового цвета
 - 5) кашель с обильным отхождением слизисто-гнойной мокроты
55. Для боли при приступе стенокардии характерно:
- 1) внезапность
 - 2) постепенное усиление
 - 3) длительность более 30 минут
 - 4) купирование после приёма нитроглицерина
 - 5) всё перечисленное верно
56. Для диабетической комы характерны симптомы:
- 1) кожные покровы влажные, твердые глазные яблоки, отсутствие запаха ацетона
 - 2) гиперсаливация
 - 3) повышение уровня АД
 - 4) сухость кожи, шумное глубокое дыхание, мягкие глазные яблоки
 - 5) брадикардия
57. Что должна сделать медицинская медсестра при развитии гипогликемического состояния у пациента в больничных условиях:
- 1) дать выпить 50 мл 50% спирта
 - 2) дать горячий чай с 5-6 кусочками сахара
 - 3) ввести внутривенно 1 мл 1% раствора лазикса
 - 4) наложить венозные жгуты на 2-3 конечности
 - 5) ввести в корень языка адреналин
58. Боль при инфаркте миокарда купируется:
- 1) антигипертензивными препаратами
 - 2) спазмолитиками
 - 3) сердечными гликозидами
 - 4) наркотическими анальгетиками
 - 5) десенсибилизирующими препаратами
59. При проведении реанимации соотношение вдохов и компрессий:
- 1) 1:18
 - 2) 1:5
 - 3) 2:30
 - 4) 2:10
 - 5) 1:15
60. Критерий правильности выполнения непрямого массажа сердца:
- 1) появление пульсовых волн на общей сонной артерии при проведении компрессий
 - 2) появление самостоятельного пульса на общей сонной артерии
 - 3) повышение артериального давления на периферических артериях
 - 4) появление самостоятельного дыхания
 - 5) по изменению цвета кожных покровов

