

Экзаменационные тесты

1. Остановку сердца определяют по:

- а. отсутствию пульса на периферии
- б. отсутствию пульса на центральных сосудах
- в. отсутствию АД

2. Какова должна быть продолжительность реанимации при наличии признаков ее эффективности:

- а. до восстановления жизнедеятельности
- б. 30 мин
- в. 1 час
- г. 5-6 мин.

3. К развитию гипогликемической комы приводят следующие причины:

- а. повышенное содержание глюкозы
- б. отравление окисью углерода
- в. передозировка инсулина.

4. В результате ножевого ранения возникло артериальное кровотечение из плечевой артерии. Ваша тактика?

- а. необходимо наложить тугую давящую повязку
- б. необходимо наложить жгут
- в. достаточно - пальцевое прижатие артерии

5. При отеке Квинке с локализацией в области гортани в первую очередь необходимо ввести:

- а. лазикс
- б. адреналин
- в. преднизолон
- г. анальгин

6. Фторотан может привести к угрожающим жизни нарушениям ритма, т.к. повышает чувствительность сердца к следующим препаратам:

- а. лидокаину
- б. мезатону
- в. адреналину

7. После автомобильной аварии пострадавший бледен, возбужден, апроцианоз, холодный липкий пот, кричит, не дает провести обследование. О чем это свидетельствует?

- а. недисциплинированный больной
- б. эректильная фаза шока
- в. торпидная фаза шока

8. Во время реанимации медсестра почувствовала хруст и патологическую подвижность ребер. Реанимация проводится в течение 45 минут. Критериев эффективности реанимации не отмечается. Ваша тактика?

- а. прекратить реанимацию

- б. продолжить реанимацию
- в. продолжить реанимацию до полного восстановления сердечной деятельности

9. Учащение дыхания обозначают термином:

- а. брадипноэ
- б. апноэ
- в. диспноэ
- г. тахипноэ

10. Дитилин нельзя вводить больным с:

- а. диабетом
- б. бронхитом
- в. глаукомой

11. Строфантин вводят внутривенно:

- а. струйно
- б. медленно, в течение 5 минут
- в. скорость введения никакого значения не имеет

12. В городском парке Вы обнаружили человека без признаков жизни, при осмотре кожные покровы - теплые, дыхания - нет, пульсация на сонной артерии - нет, зрачки - широкие, в центре - участок помутнения. Ваша тактика?

- а. Клиническая смерть, срочно начать реанимацию
- б. Биологическая смерть, реанимация не показана

13. Мужчина, 28 лет, пострадал в автомобильной катастрофе. Дыхания нет, пульс на сонной артерии не определяется. Сознание отсутствует. На уровне пояса у пострадавшего - широкий кожаный ремень. Последовательность Ваших действий?

- а. Не теряя времени на снятие пояса немедленно приступить к реанимации
- б. Снять пояс и немедленно начать реанимацию
- в. Не трогать пострадавшего до прибытия ГАИ

14. Что в наибольшей степени характеризует глубину коматозного состояния?

- а. Выраженность гемодинамических расстройств
- б. Степень угнетения сознания
- в. Степень угнетения рефлексов

15. Какой способ промывания желудка рекомендуется при отравлении кислотами и щелочами?

- а. Промывание желудка противопоказано
- б. <Ресторанным способом>
- в. Зондовое промывание желудка после купирования болевого синдрома
- г. Вызов рвоты

16. Какой из анестетиков нельзя использовать у больных с ЧМТ:

- а. Фторотан
- б. Закись азота

- в. Калипсол
- г. Эфир

17. Антидотом какого релаксанта является прозерин?

- а. Дитилин
- б. Миорелаксин
- в. Листенон
- г. Тубарин

18. В экстренных ситуациях кровь для переливания подогревают в воде, температура которой не превышает:

- а. 37-38 градусов С
- б. 38-40 градусов С
- в. 38-42 градуса С
- г. 42-44 градуса С

19. Какое состояние относится к терминальному?

- а. обморок
- б. шок
- в. клиническая смерть
- г. биологическая смерть.

20. Через 3 минуты после начала реанимации Вы заметили, что вдвигать воздух становится все труднее, слабые экскурсии грудной клетки, пульсация на сонной артерии - хорошая, зрачки - широкие. Ваши действия:

- а. Реанимация неэффективна, прекратить реанимацию
- б. Неэффективная ИВЛ, восстановить проходимость дыхательных путей, продолжить реанимацию
- в. Реанимация эффективная, продолжить реанимацию

21. Ребенок 3 лет, играя, засунул в ухо горошину. Ваша тактика?

- а. Необходимо удалить пинцетом горошину
- б. Закапать масло в ухо
- в. Закапать спирт в ухо
- г. Немедленно доставить в лечебное учреждение

22. У пострадавшего множественные переломы ребер, верхней и нижней конечности. Он бледен, черты лица заострены, безразличен к окружающему, пульс - 120 в минуту, АД - 80/50 мм рт. ст. О чем это говорит?

- а. Эректильная фаза шока
- б. Торпидная фаза шока

23. Какие осложнения могут наблюдаться при проведении ИВЛ методом <рот в рот>?

- а. Вывих нижней челюсти
- б. Фибрилляция желудочков
- в. Разрыв альвеол, пневмоторакс
- г. Регургитация рвотных масс

24. Неотложная доврачебная помощь при желудочном кровотечении:

- а. покой, холод на живот
- б. обильное питье
- в. грелка на живот
- г. промывание желудка.

25. Какое осложнение можно предположить, если у больного во время переливания крови появилась боль в пояснице:

- а. Цитратный шок
- б. Анафилактический шок
- в. Гемотрансфузионный шок
- г. Воздушная эмболия

26. Какой препарат является антидотом при отравлении морфином?

- а. Атропин
- б. Налорфин
- в. Хромосмон
- г. Унитиол

27. При синдроме длительного сдавливания на месте повреждения в порядке оказания первой медицинской помощи необходимо:

- а. После освобождения от компрессии сделать тугое бинтование конечности и транспортную иммобилизацию, обезболить
- б. Освободить от компрессии и срочно ввести наркотики

28. К противорвотным препаратам относятся:

- а. Адреналин
- б. Бисептол
- в. Анальгин
- г. Церукал

29. Без какого вещества в премедикации опасно проведение эндотрахеального наркоза:

- а. Седуксен
- б. Промедол
- в. Атропин
- г. Димедрол

30. Какое положение можно придать больному после наркоза:

- а. Устойчивое боковое положение без подушки
- б. На животе на низкой подушке
- в. На спине на низкой подушке с повернутой на бок головой

31. При введении больному миорелаксанта расслабление мышц наступило постепенно, без предшествующих фибриллярных сокращений. Какой введен препарат?

- а. Миорелаксин
- б. Тубарин
- в. Дитилин

г. Листенон

32. Характерно повышение АД при вводимом наркозе для следующего препарата:

- а. Сомбревина
- б. Кетамина
- в. Гексенала

33. Для какого состояния характерны следующие симптомы: резко нарастающая одышка, переходящая в удушье, кашель с пенистой мокротой, хриплое шумное дыхание?

- а. Обморок
- б. Шок
- в. Коллапс
- г. Отек легких
- д. Стенокардия

34. При попадании жидкого аммиака в глаз необходимо:

- а. Немедленно промыть глаз водой
- б. Раствором соды
- в. Борной кислотой

35. Первоочередным мероприятием при анафилактическом шоке является:

- а. Введение антигистаминных препаратов
- б. наложение жгута
- в. В/в введение адреналина и преднизолона
- г. Подкожное введение адреналина в место инъекции

36. Перед срочным наркозом премедикация проводится:

- а. В/в за 40 минут до наркоза
- б. В/м за 40 минут до наркоза
- в. В/в непосредственно перед наркозом
- г. В/м непосредственно перед наркозом

37. Для какой стадии наркоза характерна следующая симптоматика: повышенный тонус скелетных мышц, умеренное расширение зрачков при сохранении их реакции на свет и подвижных глазных яблоках, крепкое сжатие век?

- а. Первая стадия
- б. Вторая стадия
- в. Третья стадия
- г. Четвертая стадия

38. Концентрация кислорода при подаче больному через носовой катетер составляет не более:

- а. 40%
- б. 60%
- в. 80%

39. С какой частотой проводится непрямой массаж сердца у новорожденных?

- а. 100-120 в мин.
- б. 50-70 в мин.
- в. 180 в мин.
- г. 40-60 в мин.

40. Какой препарат целесообразно использовать для акушерского сна-отдыха при утомлении в родах?

- а. Фентанил
- б. Промедол
- в. Оксibuтират натрия
- г. Кетамин

41. С какой частотой проводят ИВЛ у новорожденного?

- а. 20-30 в мин.
- б. 40-60 в мин.
- в. 100-120 в мин.
- г. 12-16 в мин.

42. Критерием кардиогенного шока не является:

- а. Падение систолического АД ниже 90 мм рт ст
- б. Олигурия
- в. Пульсовое давление меньше 20 мм рт ст
- г. +Бронхоспазм

43. При проведении операции по срочным показаниям под наркозом, при условии, что больной принимал пищу за 1 час до поступления:

- а. Операцию можно начинать после заведения зонда
- б. Нельзя начинать, ждать 6 часов, затем введение зонда в желудок
- в. Можно ограничиться назначением альмагеля, фосфолюгеля

44. При внутривенном введении некоторых наркотических препаратов отмечаются боли по ходу вен, развивается тромбофлебит. Эти отрицательные качества проявляются у препарата:

- а. Тиопентала-натрия
- б. Кетамина
- в. Оксibuтирата-натрия
- г. Ни у одного из указанных препаратов этих качеств нет

45. С целью профилактики воздушной эмболии при катетеризации подключичной вены:

- а. Поднимают ножной конец кровати
- б. Голову больного поворачивают в противоположную сторону
- в. Под лопатки подкладывают валик, высотой 10 см

46. При переливании плазмы реципиенту необходимо:

- а. Проведение пробы на совместимость по системе АВО
- б. Проведение биологической пробы
- в. Переливание плазмы в соответствии резус-принадлежности

47. Больной, находящийся на ИВЛ, интубирован пластмассовой термопластической трубкой. Предельный срок допустимости пребывания трубки в трахее без реинтубации является:

- а. 6 часов
- б. 12 часов
- в. 3 дня
- г. 7-10 дней

48. Какова максимальная продолжительность клинической смерти в обычных условиях?

- а. 1-2 мин
- б. 2-3 мин
- в. 4-5 мин
- г. 6-7 мин.

49. Главный критерий эффективности ИВЛ - это:

- а. сужение сосудов
- б. движение грудной клетки
- в. порозовение кожных покровов
- г. появление пульсации на сонной артерии.

50. Для какого состояния характерны следующие симптомы: резко нарастающая одышка, переходящая в удушье, кашель с пенистой мокротой, хриплое шумное дыхание?

- а. Обморок
- б. Шок
- в. Коллапс
- г. Отек легких
- д. Стенокардия

51. Как поступить, если при определении группы крови на тарелках во всех ячейках агглютинация:

- а. Перепроверить с новыми сыворотками
- б. Перенести в другую комнату
- в. Подогреть
- г. Проверить с сывороткой 4 группы

52. Какой симптом является признаком биологической смерти:

- а. отсутствие Ps на сонной артерии
- б. отсутствие дыхания
- в. широкий зрачок
- г. <кошачий глаз>.

53. В порядке оказания первой помощи при термическом ожоге необходимо:

- а. охладить обожженную конечность водой, асеп. пов.
- б. наложить повязку с облепиховым маслом
- в. наложить повязку с маслом шиповника
- г. обработать гусиным жиром.

54. При отравлении ФОС антидотом является:

- а. Атропин
- б. Прозерин
- в. Унитиол

55. При отравлении метиловым спиртом антидотом является:

- а. Атропин
- б. Этиловый спирт
- в. Унитиол
- г. Тиосульфат натрия

56. Симптомы ожога II степени:

- а. Пузырьки с серозным содержимым
- б. Пузырьки с геморрагическим содержимым

57. Основной признак коматозного состояния:

- а. Угнетение гемодинамики
- б. Угнетение дыхания
- в. Угнетение ЦНС
- г. Угнетение периферической нервной системы

58. При падении больной ударился головой, из уха пошла кровь. Это признак:

- а. Сотрясения головного мозга
- б. Внутричерепной гипертензии
- в. Перелома основания черепа
- г. Травмы уха

59. При асфиксии кровь:

- а. Темнеет
- б. Светлеет

60. Атропин противопоказан при:

- а. Глаукоме
- б. Бронхиальной астме
- в. Язвенной болезни
- г. Черепно-мозговой травме