

## ПРОФИЛАКТИКА КОКЛЮША



Коклюш у взрослых проходит довольно тяжело и может стать причиной серьезных **осложнений**, таких как **судороги и энецефалопатия**. У пациентов в возрасте старше 30 лет в 5-9 % случаев возникает **пневмония**. У женщин старше 50 лет в 34% случаев выявляется недержание мочи, связанное с коклюшем. Кроме того регистрируются такие осложнения, как **переломы ребер, паховая грыжа, удушье, грыжа поясничного диска, обмороки**.

- Симптомы коклюша у взрослых:**
1. Общее недомогание и снижение аппетита
  2. Незначительное увеличение температуры тела, которое сопровождается насморком и небольшим кашлем, симптомы начинают быстро усиливаться
  3. Симптомы у взрослых напоминают симптомы бронхита, поэтому заболевание сразу выявить не очень просто.
  4. У некоторых болезнь проходит **незаметно**, что ведет к **массовому инфицированию контактных лиц**.

**Источником заражения** может быть только человек (больной типичными или атипичными формами коклюша или здоровые бактерионосители).

**Путь передачи инфекции** – **воздушно-капельный**. Обильное выделение возбудителя происходит при чихании и кашле.

**Будьте здоровы**

**Коклюш** – острое инфекционное заболевание бактериальной природы, проявляющееся в виде приступов спазматического кашля, сопровождающих катаральную симптоматику.



**Возбудитель инфекции** – коклюшная палочка, которая выделяет специфический токсин.

## **ПРОФИЛАКТИКА**

1. Тщательно **мыть** руки



2. При контакте с больными **носить** хирургические маски.



3. **Производить** дезинфекцию



4. Детям до года и непривитым лицам, контактировавшим с больным, **проводят** экстренную профилактику.



5. **Изолировать** больного

