



Говоря о профилактических прививках, мы подчас забываем о том, что они обеспечивают здоровье не только настоящего поколения, но и будущих наших детей.

Полноценная иммунизация девочек и девушек обеспечивает их защиту от инфекционных заболеваний, а в дальнейшем - защиту и плода, и новорожденного, получившего антитела от матери в процессе рождения и с грудным молоком.

**ВАЖНО ЗНАТЬ!** Беременность не является противопоказанием к проведению вакцинации!

Если планируется беременность, и сведений о вакцинации нет, то за **3-6** месяцев необходимо провести вакцинацию против краснухи, кори, паротита (КПК).



## Чем опасны эти инфекции для беременной?

**Корь и краснуха** – повышают риск преждевременных родов и мертворождений.

**Эпидемический паротит**, перенесенный в I триместре беременности повышает риск смертности плода.

**Ветряная оспа - опасна**, как для самой женщины, так и для плода, может вызвать патологию зрения, а также задержку умственного и физического развития плода.

**Гепатита В** - приводит к хроническим заболеваниям печени, с последующим развитием цирроза и рака печени.

Вакцина против гепатита В может быть рекомендована только женщинам, входящим в группу высокого риска по инфицированию гепатитом В (если опасность заражения исходит от кого-то из близких).

**Грипп** - большинство летальных исходов наблюдается в III триместре беременности.

*Ежегодная вакцинация беременных против гриппа не имеет противопоказаний, не оказывает негативного влияния ни на состояние беременной, ни на плод и проведённая во II и III триместрах беременности обеспечивает детям первых месяцев жизни эффективную защиту против гриппа.*

# КАКИЕ ПРИВИВКИ НУЖНЫ БУДУЩЕЙ МАМЕ?



## **Дифтерия, столбняк**

Вакцинация против этих заболеваний проводится в случае травмы, укуса животных (экстренная профилактика). Вместо вакцины применяется специфический иммуноглобулин – готовые антитела. Если вакцинация против дифтерии и столбняка была проведена менее 5 лет назад – беременная женщина защиту уже имеет

## **Коклюш**

Способствует выкидышу и мертворождениям. Проведение вакцинации против коклюша возможно после 27-й недели беременности.

## **Бешенство**

укус больным бешенством животным в 100% случаев приводит к летальному исходу. Экстренная вакцинация является жизненно необходимой.

**Категорически нельзя вакцинировать беременных женщин против:**

- ❖ Туберкулеза
- ❖ Менингококковой инфекции
- ❖ Кори, краснухи, эпидемического паротита,
- ❖ Ветряной оспы.
- ❖ Брюшного тифа.

*Если Вы планируете беременность – убедитесь в том, что Ваш организм под защитой!*

Единый консультационный центр  
Роспотребнадзора  
**8 800 555 49 43**