

ТУБЕРКУЛЁЗ ИЗЛЕЧИМ



Регулярное обследование гарантирует раннее выявление и своевременное лечение туберкулеза



Дети

Ежегодная туберкулинодиагностика,
группы риска - 2 раза в год



Подростки

Ежегодная туберкулинодиагностика,
группы риска - 2 раза в год
Флюорография - в 15 и 17 лет,
группы риска - 1 или 2 раза в год



Взрослые

флюорографическое обследование
не реже 1 раза в 2 года,
группы риска - 1 или 2 раза в год

Группы риска:

- лица, живущие с ВИЧ,
- дети и подростки, не привитые против туберкулеза,
- лица, больные неспецифическими хроническими заболеваниями,
- лица, получающие кортикостероидную, лучевую и цитостатическую терапию,
- военнослужащие,
- лица, находящиеся в контакте с источниками туберкулезной инфекции,
- лица, снятые с диспансерного учета (в течение первых 3 лет),
- пациенты, состоящие на диспансерном учете в наркологических и психиатрических учреждениях,
- бездомные, заключенные, мигранты и другие

Порядок и частота обследования лиц из групп риска определены Приказом Минздрава РФ от 21 марта 2017 г. N 124н "Об утверждении порядка и сроков проведения профилактических медицинских осмотров граждан в целях выявления туберкулеза" и СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"

Обратитесь к врачу, если у вас есть один или несколько симптомов:



кашель более
3 недель



лихорадка и
озноб



снижение
веса



кровохарканье,
«ржавая мокрота»



боль в груди
при дыхании



ночная
потливость



быстрая
утомляемость